



## Сталий розвиток сільського господарства

Sustainability\* – вагома складова стратегії BASF

**Керуйте стійкістю до шкідників**

- Не обприскуйте одним і тим самим активним інгредієнтом два рази підряд
- Чергуйте продукти з різними способами дії

**Захищайте водні ресурси**

- Використовуйте форсунки для зменшення знесення вітром та формуйте вздовж водойм захисні рослинні смуги шириною щонайменше 5 метрів
- Враховуйте високий ризик стоку на деяких полях та вживайте необхідних заходів для його мінімізації
- Уникайте застосування пестицидів незадовго до сильного дощу (<48 год)

**Уникайте джерел точкового забруднення**

- Тричі прополосніть порожні канистри та передайте їх на утилізацію
- Працюйте з пестицидними залишками та утилізуйте їх безпечним та законним шляхом
- Обприскувач потрібно промивати у відкритому полі, на відстані щонайменше 10 метрів від водойм та колодязів

**Використовуйте засоби захисту**









- Обов'язково використовуйте належні засоби індивідуального захисту під час виконання операцій зі змішування, обприскування та миття
- Мийте рукавиці перед тим, як їх зняти
- Захисний одяг слід прати окремо від особистого

**Захищайте біологічне різноманіття навколо ваших полів**

- Активно доглядайте за смугами з дикорослою рослинністю та незасіяними краями полів, щоб створити середовище для життя тварин та рослин
- Розставляйте гнізда та годівнички для диких птахів
- Використовуйте обладнання та методи управління, що захищають ґрунт
- Заручіться підтримкою експертів у галузі сільського господарства чи охорони довкілля

Детальніше див. на: <http://www.agro.basf.ua/sustainability> та <http://pracynazemi.com.ua/development>  
 \* У перекладі з англ. «сталість»

## Позиціонування препаратів BASF у системі захисту винограду

	Розпускання бруньок	5–7 листків	Початок цвітіння	Кінець цвітіння	Формування ягід	Змикання ягід	Розм'якшення ягід	Дозрівання ягід	
 <b>Чорна плямистість</b>	<b>Делан®</b> 0,8 кг/га								
 <b>Антракноз</b>		<b>Полірам® ДФ</b> 2,0 кг/га							
 <b>Мілдью</b>				<b>Орвего®</b> 0,8–1,0 л/га +	<b>Акробат® МЦ</b> 2,0 кг/га +	<b>Орвего®</b> 0,8–1,0 л/га	<b>Полірам® ДФ</b> 2,5 кг/га	<b>Делан®</b> 0,8 кг/га	
 <b>Оїдіум</b>		<b>Кумулюс® ДФ</b> 4,0–6,0 кг/га		<b>Стробі®</b> 0,3 кг/га	<b>Колліс®</b> 0,4 л/га	<b>Вівандо®</b> 0,2 л/га	<b>Акробат® МЦ</b> 2,0 кг/га +	<b>Вівандо®</b> 0,2 л/га	<b>Кумулюс® ДФ</b> 6,0 кг/га
 <b>Сіра гниль</b>							<b>Акробат® МЦ</b> 2,0 кг/га +	<b>Колліс®</b> 0,4 л/га	
 <b>Кліщі</b>			<b>Масаї®</b> 0,4 кг/га застосування навесні					<b>Масаї®</b> 0,4–0,6 кг/га застосування влітку	
 <b>Сисні шкідники</b>						<b>Бі-58® Новий</b> 1,5 л/га			
 <b>Гронова листокрутка</b>					<b>Бі-58® Новий</b> 1,5 л/га		<b>Номолт®</b> 0,5 л/га		